



AGRĪNĀS GRUPAS KUKURŪZAS HIBRĪDS

DKC 2684

Sēklu piedāvājums pavasara sējai.

RM*/FAO

76/210-220



RM* – relatīvais augu briedums – dienu skaits no dīgstu parādīšanās līdz ziedēšanas sākumam

Hibrīda raksturojums:

Vidēji agrīns hibrīds augstvērtīgas skābbarības ražošanai. Piemērots vēsākiem klimatiskajiem apstākļiem.

Strauja augu attīstība pavasarī ar ļoti labu izturību uz zemākām temperatūrām veģetācijas sākumā, kā arī augu spēcīga un pilnvērtīga attīstība visā veģetācijas periodā, veidojot graudu pilnas valītes. Augi, maz ietekmējoties no darbību un vides nelabvēlīgiem apstākļiem, veido pilnas graudu valītes, jo DKC2684 tiek raksturots kā "fixed ears" hibrīds, kas raksturojas ar pilnvērtīgu graudu vālišu izveidi veģetācijas periodā.

Augiem raksturīga spēcīga sakņu sistēma, spēcīgi stublāji un ļoti laba veldres noturība.

Augu stublājam un arī vāļītēm laba noturība pret fuzariozes ierosinātajām slimībām.

Hibrīds noturīgs situācijās, ja ir izteikts mitruma nodrošinājuma trūkums augsnē un arī noturīgs pie izteiktām mitruma režīma svārstībām. Norādes un novērojumi liecina, ka hibrīdam piemīt īpašība ļoti labi atdot mitrumu no graudiem (dry down - izžūt), svarīga īpašība pie graudu ieguves no kukurūzas platībām.

Hibrīda priekšrocības:

Hibrīds nodrošinās augstas un stabilas ražas vidēji agrīno hibrīdu grupā.

Labi padosies īpaši vidējas auglības un mazāk auglīgās augsnēs.

Izsējas normu ieteikums:

Audzējot skābbarības ieguvei –
pie pietiekama mitruma nodrošinājuma 9 sēklas/m²,
mitruma deficīts, sausāki lauki – 8 sēklas/m²

Audzējot graudu ieguvei –
pie pietiekama mitruma nodrošinājuma 8.5 – 9 sēklas/m²,
mitruma deficīts, sausāki lauki – 7.5 sēklas/m²

DKC 2684 dati no DEMO laukiem 2020. gads.

1. A/S Agrofirma Tērvete, Kroņaucē, DEMO lauks novākts 8.oktobrī
 - a. Ražība – 49,38 t/ha¹
 - b. Sausnes saturs novākšanas laikā – 28.5%
 - c. Sausnes ražība – 14.07 t/ha
 - d. Cietes saturs saussnē novākšanas laikā – 33.6%
2. SIA LLU MPS Vecauce DEMO lauks novākts 12.oktobrī
 - a. Sausnes saturs novākšanas laikā – 32.64%
 - b. Cietes saturs saussnē novākšanas laikā – 33.13%

